

# FICHA TECNICA

## IVERMIC T

**Nematodocida Tenicida Equino**

### COMPOSICIÓN:

Ivermectina .....	1,0 g
Prazicuantel .....	15,0 g
Excipientes c.s.p. ....	100,0 g



### INDICACIONES de USO:

Nematodocida y Tenicida oral en pasta.

Para el control y tratamiento de las parasitosis internas (redondos y planos) de los equinos.

*Espectro de actividad:* Nematodos gastrointestinales: Grandes *Strongylus* (grandes: adultos y larvas migrans): *Strongylus vulgaris*, *Strongylus edentatus*, *Strongylus equinus* y *Triodontophorus spp.*

Pequeños *Strongylus* (incluidos aquellos resistentes a benzimidazole):

*Cylicocylus spp.*, *Cylicostephanus spp.*, *Cylicodontophorus spp.*, *Gyalocephalus spp.* (adultos y larvas de 3er. y 4to. estadio).

*Parascaris equorum*, *Oxyuris equi*, *Trichostrongylus axei* (adultos y larvas de 3er. y 4to. estadio), *Habronema muscae* (adultos), *Draschia spp.* (larvas de 3er. estadio).

Nematodos pulmonares: *Dictyocaulus arnfieldi* (adultos y larvas de 3er. y 4to. estadio)

Nematodos cutáneos: *Habronema muscae*, *Draschia spp.*, *Onchocerca spp.*

Larvas de: *Gasterophilus* (estados orales y gástricos)

Cestodos: (Tenias) *Anoplocephala magna* y *perfoliata*. *Paranoplocephala mamillana*.

### ESPECIES ANIMALES A LAS QUE SE DESTINA:

Equinos.

### DOSIFICACIÓN:

200 mcg de Ivermectina y 3 mg de Prazicuantel por kg de peso vivo equivalente a 2 g de producto cada 100 kg de peso.

Para facilitar la dosificación el producto se presenta en jeringas dosificadoras, graduadas según cantidad de producto (12 g c/ 600 kg de peso).

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral.