

Notas importantes:

- 1 No se debe aplicar la poliacrilamida en una articulación con lesión activa o con sinovitis significativa.
- 2 Considerar un protocolo con AINE´s por 48 horas post aplicación, ya que algunos caballos pueden sentir dolor inmediatamente después de la inyección.
- 3 Se recomienda un programa de ejercicio controlado durante las primeras 2 semanas (10-14 días) después de la inyección para evitar un evento adverso (sinovitis aséptica). Este es un evento adverso peculiarmente raro de todas las poliacrilamidas.
- 4 Las poliacrilamidas tardan 4 semanas en alcanzar su efecto máximo.
- 5 En casos severos se puede repetir la dosis en 5-6 semanas hasta alcanzar el efecto deseado.
- 6 Noltrex Vet es muy viscoso (espeso), lo que podrá afectar su técnica de inyección.

Consulte la guía de uso de NOLTREX[®]Vet para más recomendaciones.

Tabla de dosificación:

Articulación	VOLUMEN RECOMENDADO DE NOLTREX®VET: 1 jeringa = 2.5 ml
Interfalángica - distal	1 - 2.5 ml
Bursa del Navicular	1 - 2 ml
Metacarpo/Metatarso-falángica	1 - 2.5 ml
Articulaciones del carpo	2.5 ml por articulación afectada
Escápulo - humeral	2.5 - 4 ml
Tibiotarsiana	2.5 ml
Tarsometatarsiana Distal-intertarsiana	1 - 2 ml 0.5 - 1 ml
Fémoro - tibio - patelar	2.5 - 5 ml por compartimento, según el nivel de gravedad
Coxofemoral	2.5 ml

Debido a la variabilidad de tamaño en las articulaciones de los equinos y al mecanismo de acción único de Noltrex®Vet, se han hecho recomendaciones de volumen a partir de las respuestas clínicas observadas al tratamiento.

**ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA UN SOLO USO:
 ¡NO CONSERVE DOSIS PARCIALMENTE UTILIZADAS, YA QUE
 NO SE MANTENDRÁ LA ESTERILIDAD!**